



HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
Reg. Nacional ICA No. 362
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



LEGEND® 400 SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Bispyribac sodio:400 g/L,
de formulación a 20 °C

Ingredientes aditivos:c.s.p 1 Litro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LEGEND® 400 SC es un herbicida sistémico selectivo al cultivo del arroz usado para post-emergente en control de malezas gramíneas, cyperáceas, y de hoja ancha en arroz de riego y seco. El herbicida **LEGEND® 400 SC** inhibe la actividad de una enzima en las plantas, la Acetolactato Sintetasa (ALS), la cual es esencial para la biosíntesis de 3 aminoácidos de cadena esenciales: valina, leucina e isoleucina. Esta inhibición interfiere con la división celular y causa la detención del crecimiento en las plantas sensibles. La interrupción inicial del crecimiento, causa clorosis y muerte de las plantas afectadas.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. Días	P.R. Horas
ARROZ	Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>)	115 cc/Ha (Post-emergencia temprana con malezas de 1-2 hojas) 115 cc/ha (Post-emergencia tardía/ escapes)	60	0
	Guarda rocío (<i>Digitaria horizontalis</i>), Falsa caminadora (<i>Ischaemun rugosum</i>), Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>), Tamarindillo (<i>Aeschynomene sp</i>), Espadilla (<i>Corchorus orinocensis</i>), Palo de agua (<i>Ludwigia linifolia</i>), Coquito amarillo (<i>Cyperus esculentus</i>), Menta o cortadera (<i>Cyperus iria</i>), Piñita (<i>Murdannia nudiflora</i>), Barba de indio (<i>Fymbristylis meliacea</i>).	115 cc/Ha (Post-emergencia temprana, con malezas de 1-2 hojas)		

P.C.: Periodo de carencia: No aplica ya que bajo las condiciones de uso recomendadas y la degradación del producto no se esperan residuos en el cultivo.

P.R.: Periodo de Reentrada: Dado que es un herbicida no es aplicado al cultivo, sino a las malezas a controlar, no se espera una exposición potencial del trabajador al realizar labores al cultivo, puede ingresar al área tratada después de la finalización de la aplicación, utilizando botas, overol de manga larga y pantalón largo, si requiere realizar alguna labor en el suelo o alguna actividad que pueda entrar en contacto con las malezas aplicadas debe usar guantes.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
Reg. Nacional ICA No. 362
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

LEGEND® 400 SC

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

LEGEND 400 SC debe ser aplicado en postemprana. La maleza debe tener entre 1 a 2 hojas y debe cubrirse homogéneamente con la pulverización, evitando la deriva y doble aplicación. Entre el 1º y 3º día post-aplicación se recomienda inundar los lotes con agua. En aplicaciones terrestres aplicar volumen de 200 L/ha de agua. Haciendo un uso racional del producto, que implique su aplicación en el momento oportuno, conforme a una buena práctica agrícola, con una inundación permanente a partir de 1 a 4 días de aplicado, no es necesaria la mezcla con productos pre-emergentes. En situaciones donde es necesaria mayor residualidad se requiere un efecto de sellado. **LEGEND® 400 SC** necesita de un surfactante no-iónico en dosis de 0.1% (1 cc/L) del volumen total de la mezcla a utilizar. Aplicar **LEGEND® 400 SC** en suelo húmedo, sin lluvia y en la mañana. En el momento de realizar la aplicación, es necesario que el suelo se encuentre en estado barroso, sin lámina de agua, e inundar el campo 48-72 horas después de aplicado.

LEGEND® 400 SC debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros herbicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas-HRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Aplicar con cualquier aspersora de volumen medio a alto, con mecanismo de agitación. Para óptima distribución, utilizar boquillas de abanico plano. Verificar la calibración de los equipos y recordar que ésta se hace más crítica al disminuir el volumen de agua empleado por hectárea. Se aplica por aspersión foliar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Realizar una pre-mezcla con agua más la dosis recomendada de **LEGEND® 400 SC**, a fin de diluir el producto. Agregar un surfactante en la cantidad de agua recomendada y mezclar, luego añadir la premezcla y agitar. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo muy bien para evitar la contaminación de otros cultivos con los residuos.

FITOTOXICIDAD

LEGEND® 400 SC no causa fitotoxicidad sobre los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.**

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.
- Si contacta la piel, quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Si contacta los ojos, lave inmediatamente con agua pura durante 10 a 15 minutos.
- Si se inhala, lleve al paciente a un lugar con aire fresco, suministrando respiración artificial de ser necesario.
- Si se ingiere, no induzca el vómito si no tiene supervisión médica.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
Reg. Nacional ICA No. 362
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



LEGEND® 400 SC

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PRESENTACIONES

1L

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

