



# MONTANA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24 Julio 2023



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

#### INGREDIENTE ACTIVO

**Fomesafen:** 5-(2-chloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolyloxy)-N-mesyl-2-nitrobenzamide de formulación a 20 °C .....250 g/L  
**Fluazifop-p-butyl:** (R)-2-[4-[5-(trifluoromethyl)-2pyridyloxy]phenoxy]propionic acid de formulación a 20 °C.....125 g/L  
**Aditivos** ..... c.s.p. 1 L

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3142

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

### INSTRUCCIONES DE USO

**MONTANA** es una mezcla de dos herbicidas, fomesafen de contacto y fluazifop-p-butil sistémico; es un producto que presenta una amplia ventana de aplicación, selectivo al cultivo de frijol que se usa en el control post emergente de las malezas. El síntoma característico en la maleza es una rápida necrosis de las hojas, la cual resulta en la muerte completa de la maleza.

CULTIVOS	MALEZAS	LMR mg/Kg	DOSIS	P.C	P.R
Frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L)	<b>GUALOLA</b> ( <i>Polygonum nepalense</i> )	Fluazifop-p-butyl: 40 (Codex)  Fomesafen: 0.01 (EU)	1.0 L/ha	N.A	0 HORAS
	<b>AMOR SECO/PAPUNGA</b> ( <i>Bindens pilosa</i> )				
	<b>TRÉBOL</b> ( <i>Oxalys</i> sp)				
	<b>GUASCAS</b> ( <i>Galinsoga parviflora</i> )				
	<b>FLOR DE MUERTO</b> ( <i>Tagetes erecta</i> )				
	<b>RAY GRASS</b> ( <i>Lolium peremne</i> )				
	<b>TACHE</b> ( <i>Oxalis triangularis</i> )				
<b>CULANTRILLO</b> ( <i>Spergula Arvensis</i> )					
<b>CERRAJA</b> ( <i>Sonchus oleraceus</i> )					

**PC:** Periodo de Carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha

**PR:** Periodo de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada por personas o animales.

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos.

**N.A:** No aplica

### MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto en una (1) sola oportunidad por ciclo de cultivo al evidenciar la presencia de malezas en el cultivo, en estado activo de crecimiento con 2 a 3 hojas. La aplicación se puede realizar tanto en pre-emergencia como en post-emergencia temprana al cultivo dentro de un programa de manejo integrado de malezas.

Se recomienda realizar la aplicación con suelos húmedos y plantas en activo crecimiento para que el producto se pueda mover en la planta con mayor eficacia.

### COMPATIBILIDAD

**MONTANA** es compatible con los plaguicidas que usan normalmente, sin embargo, se recomienda realizar una mezcla previa a pequeña escala para evaluar posibles incompatibilidades no registradas

### RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO

## ATENCIÓN