



Insecticida piretroide de amplio espectro

Registros

Licencia de Venta ICA No. 7092-MV

Registro Min. Salud No. RGSP-0093-98

Concepto toxicológico No. Mp-4642-94

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo:..... Alfacipermetrina

Concentración:60g/L

Formulación:Suspension Concentrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Mantener el producto bien tapado en su envase original y en un lugar fresco
- NO aplicar sobre personas, animales o alimentos
- NO comer, beber o fumar durante el manejo del producto
- Evitar contacto con piel, ojos, nariz y boca
- NO inhalar la neblina durante la aspersión

FENDONA® se aplica por sistema de aspersión previa dilución en agua, dirigida a los sitios donde viven o transitan los insectos con especial énfasis en paredes, techos, pisos, grietas y estibas donde se localizan las plagas.



DOSIS FENDONA 60 SC	TRATAMIENTO		
INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	Dosis de Ataque (Infestaciones severas o persistencia prolongada)	10 ml por 1L de agua	1 L de dilución por 20 – 25 m ²
	Dosis de mantenimiento	5 ml por 1L de agua	1 L de dilución por 20 – 25 m ²

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfono 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Servicio integral al cliente BASF 018000 5222730ó (1) 6342020.

Titular del Registro: BASF Química Colombiana S.A.

Registros

Licencia de Venta ICA No. 7092-MV

Registro Min. Salud No. RGSP-0093-98

Concepto toxicológico No. Mp-4642-94





- Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el programa de campo limpio de recolección de la cámara procultivos de la ANDI.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Banda Azul - CATEGORIA TOXICOLOGICA III: MEDIANAMENTE TOXICO

Distribuido por:
Proclag sas
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Tel. 6837122
Bogotá, D.C.