

INFORMACIÓN TÉCNICA



INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

INGREDIENTE ACTIVO:

Buprofezin 250 g/l
[(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one]

Grupo Químico: Thiadiazine – IGR

USOS: Ornamentales, arroz, habichuela, uchuva.

Mecanismo de Acción: **OPORTUNE 25 SC (Buprofezin)** inhibe la deposición de la cutícula durante la muda. Suprime la postura de los huevos. Inhibe también la síntesis de prostaglandinas.

Modo de Acción: **OPORTUNE 25 SC (Buprofezin)** es un insecticida regulador del crecimiento de los insectos, con un efecto prolongado en el control de varias plagas, especialmente en HOMÓPTEROS. Actúa tanto por ingestión como por contacto.

Apariencia: Líquido color crema.

PRESENTACIONES: envases plásticos (PEAD) de 200 cc y 1 litro de contenido neto.

Categoría Toxicológica: III (Medianamente Tóxico - Cuidado)
Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero Agrónomo.

REGISTRO DE VENTA ICA # 2451 a nombre de ADNICOL S.A.S.

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Arroz	Sogata (<i>Tagosodes oryzicola</i>)	0.6 a 0.8 L/ha. Aspersión terrestre (200 L de agua) o aérea (30 a 40 L de agua)
Habichuela	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.5 cc/L de agua (0.6 L/ha.) (400 a 600 L de agua / ha.)
Ornamentales	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	En Pompón: 0.3 cc/L de agua En Alstroemeria: 0.3 cc/L de agua (2000 L de agua / ha.)
Uchuva	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.6 a 0.8 L/ha. (volumen de agua por hectárea de acuerdo con calibración del equipo)

Período de Carencia = 14 d
Período de reentrada = 12 h

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar con base en los resultados de monitoreos y de acuerdo con umbrales de daño económico, dentro de un plan de manejo integrado y rotacional de productos fitosanitarios.

- En arroz, aplicar con la aparición de las primeras infestaciones.
- En habichuela, aplicar con la aparición de las primeras ninfas en el tercio inferior de la planta, con dos aplicaciones por ciclo de cultivo, con intervalo de 15 días.
- En ornamentales, aplicar con la aparición de las primeras ninfas y repetir 10 días después.
- En uchuva, aplicar con la aparición de las primeras ninfas en el tercio superior medio de la planta.

TITULAR DEL REGISTRO:
ADNICOL S.A.S.

Kr 47 Calle 64ª-163 Bodega 33 Tel.: (574) 5 31 75 61 – Fax (574) 5 31 75 61

DISTRIBUIDO POR:

 **Sumitomo Corporation Colombia S.A.S.**

Calle 113 # 7 – 21 Oficina 1111. Tel 57-1-629 2171. Bogotá, D. C. Colombia.